

Feuille d'exercices 2

Exercice 1 Faire un dessin représentant les ensembles suivants :

- 1) l'ensemble $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 0\}$;
- 2) l'ensemble $A \cap B$ ou $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y - x^2 \geq 0\}$ et $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$;
- 3) l'ensemble $A \times \mathbb{R}$ ou $A = \{x \in \mathbb{R} \mid |x| \leq 1\}$.

Exercice 2 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application telle que $f(x) = x^2$. Comparer les ensembles suivants

- 1) $[0, 1]$ et $f^{-1}(f([0, 1]))$;
- 2) $[-1, 1]$ et $f(f^{-1}([-1, 1]))$;
- 3) $f([0, 1] \cap [-1, 0])$ et $f([0, 1]) \cap f([-1, 0])$.

Exercice 3 Soit $f : E \rightarrow F$ une application. Soient A et B deux parties de E .

- 1) Montrer que $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.
- 2) Montrer que $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$.
- 3) Construire un exemple pour lequel l'inclusion $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$ est stricte.
- 4) On suppose que f est injective. Montrer que $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.

Exercice 4 On désigne par \mathbb{N}_* l'ensemble des entiers strictement positifs. Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_*$ l'application telle que $f(x) = x + 1$. On montrera que f est une bijection par deux méthodes.

- 1) Montrer que f est injective et surjective.
- 2) Construire une application $g : \mathbb{N}_* \rightarrow \mathbb{N}$ qui est inverse à f .

Exercice 5 Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par $f(x, y) = x - y^2$.

- 1) L'application f est-elle injective ?
- 2) Montrer que l'application f est surjective.
- 3) Trouver une application $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ telle que $f \circ g = \text{Id}_{\mathbb{R}}$.
- 4) Soit $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $h(x, y) = (x + y^2, y)$. Montrer que h est une bijection. Déterminer $f \circ h$.

Exercice 6 Soit E un ensemble.

- 1) Montrer que E est un ensemble fini si et seulement s'il existe une application injective de \mathbb{N} dans E .
- 2) En déduire que E est un ensemble fini si et seulement s'il existe une partie $F \subsetneq E$ ainsi qu'une application bijective de E vers F .

Exercice 7 Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications, $h = g \circ f$.

- 1) Montrer que l'injectivité de h implique celle de f .
- 2) Montrer que la surjectivité de h implique celle de g .

Exercice 8 Soit $f : E \rightarrow F$ une application. On dit que f est *inversible à gauche* s'il existe une application $g : F \rightarrow E$ tel que $g \circ f = \text{Id}_E$. L'application g est appelée une *inverse à gauche* de f .

- 1) Montrer que, si f est inversible à gauche, alors elle est injective.
- 2) Construire un exemple pour lequel la fonction f est inversible à gauche et admet plusieurs inverses à gauche.
- 3) Montrer que, si f est injective, alors elle est inversible à gauche.

Exercice 9 Soit Ω un ensemble non-vidé. Pour toute partie A de Ω , on désigne par $\mathbb{1}_A$ l'application de Ω vers \mathbb{R} telle que

$$\mathbb{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{si } \omega \in A, \\ 0, & \text{si } \omega \notin A. \end{cases}$$

- 1) Montrer que, pour tout $A \subset \Omega$, $\mathbb{1}_A^2 = \mathbb{1}_A$, $\mathbb{1}_A + \mathbb{1}_{A^c} = 1$.
- 2) Soient A et B deux parties quelconques de Ω . Montrer que $A \subset B$ si et seulement si $\forall \omega \in \Omega, \mathbb{1}_A(\omega) \leq \mathbb{1}_B(\omega)$; $A = B$ si et seulement si $\mathbb{1}_A = \mathbb{1}_B$.
- 3) Montrer que, pour toutes les parties A et B de Ω , on a

$$\mathbb{1}_{A \cap B} = \mathbb{1}_A \cdot \mathbb{1}_B \quad \text{et} \quad \mathbb{1}_{A \cup B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_A \cdot \mathbb{1}_B.$$

- 4) Soient A , B et C trois parties de Ω . En utilisant les résultats précédents, montrer les formules suivantes :

- i) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$,
- ii) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$,
- iii) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$, $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

- 5) Soit $(A_i)_{i=1}^n$ une famille de parties de Ω . Montrer la formule d'*inclusion-exclusion* :

$$\mathbb{1}_{A_1 \cup \dots \cup A_n} = \sum_{\emptyset \neq I \subset \{1, \dots, n\}} (-1)^{\#I-1} \prod_{i \in I} \mathbb{1}_{A_i},$$

ou $\#I$ désigne le cardinal de I . [Indication : utiliser le fait que $(A_1 \cup \dots \cup A_n)^c = A_1^c \cap \dots \cap A_n^c$ et faire appel à l'exercice 6 de la feuille 1]